

PAUTAS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO EN NIÑOS

PREGUNTA

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda NO dar ningún medicamento de venta libre para la tos y resfriado en niños menores de cuatro años. Niños entre la edad de 4 a 6 años sólo se les da medicamento de venta libre para la tos y resfriado si es recomendado por el doctor del niño. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios que incluyen dificultad respirado, mareo, aumento del ritmo cardíaco y presión arterial alta.

DOSIS SEGURA

Cuando su niño tenga edad suficiente para tomar medicamentos para tos y resfriado:

- No le de medicamentos hechos para adultos.
- Si no entiende las instrucciones para dar el medicamento o no sabe cómo usar la cucharade medir no use el medicamento.
- Usando una cuchara regular de la cocina puede resultar en dando hasta tres veces más de la medicina que es necesario.
- Acetaminofen muchas veces es usado para reducir fiebre en medicamentos para resfriados. Evite usar varios medicamentos que contienen acetaminofen para evitar una sobredosis.



LLÁMANOS

Si tiene preguntas sobre medicamentos para la tos y resfriados llame 1-800-222-1222. Especialmente entrenados farmacéuticos y enfermeros están disponibles 24/7 para responder sus preguntas o asistir en una emergencia.

**OKLAHOMA
POISON
CENTER**

Treatment • Education • Prevention

1-800-222-1222

OKLAHOMAPOISON.ORG